

टस्सिभ-डी (TUSSIVE-D) / टस्सिभ डी एक्स (TUSSIVE Dx)

Dextromethorphan Hydrobromide, Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride Syrup

टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स के हो ?

यो औषधि सुख्खा खोकी लाग्दा प्रयोग गरिन्छ । यसमा भएका तत्वहरूले खोकीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै हाच्छुँयु आउने, सिंगान बग्ने र नाक बन्द हुने समस्यालाई कम गर्छ ।

टस्सिभ-डी को हरेक ५ मि.लि.मा

Dextromethorphan Hydrobromide	IP	7.5mg
Chlorpheniramine Maleate	IP	1 mg
Phenylephrine Hydrochloride	IP	2.5 mg

टस्सिभ डी एक्स को हरेक ५ मि.लि.मा

Dextromethorphan Hydrobromide	IP	15 mg
Chlorpheniramine Maleate	IP	2 mg
Phenylephrine Hydrochloride	IP	5 mg

टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स कहिले खाने ?

सुख्खा खोकी लागेको बेला

टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स कसरी खाने ?

टस्सिभ-डी को मात्रा:

बच्चा: ५ देखि १० मि.लि. दिनको ३-४ पटक अथवा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ।

- ४ वर्ष भन्दा मुनिका बच्चालाई चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र यो औषधि खुवाउनु होला ।
- औषधि प्रयोग गर्दा बोतलसँग आउने बिकोको प्रयोग गर्नुहोस् ।
- तोकिएको मात्रा भन्दा बढी प्रयोग नगर्नुहोस् ।
- सात दिन भन्दा बढी प्रयोग नगर्नुहोस् ।

टस्सिभ डी एक्स को मात्रा:

१२ वर्ष भन्दा माथिको लागि ५-१० मि.लि. दिनको ३-४ पटक अथवा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम ।

- औषधि प्रयोग गर्दा बोतलसँग आउने बिकोको प्रयोग गर्नुहोस् ।
- तोकिएको मात्रा भन्दा बढी प्रयोग नगर्नुहोस् ।
- सात दिन भन्दा बढी प्रयोग नगर्नुहोस् ।

टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स प्रयोग गर्नु पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था:

- दम, खकार आउने खोकी, चुरोट सेवनबाट भएको खोकी भएमा डाक्टरलाई यसबारे जानकारी दिने ।
- उच्च रक्तचाप, मुटु सम्बन्धि रोग भएमा ।
- आँखामा हुने तरल पदार्थको चाप धेरै भएमा ।

टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स प्रयोग गर्न नहुने अवस्था:

- यदि १४ दिन अघि MOA Inhibitor समुहको कुनै औषधि जस्तै: linezolid, phenelzine, isocarboxazid, rasagiline, selegiline, tranlycypromine प्रयोग गर्नु भएको छ भने टस्सिभ-डी/टस्सिभ डी एक्स नखानु होला ।
- यसमा भएका कुनै औषधि प्रति अति संवेदनशीलता भएमा ।
- अति उच्च रक्तचाप भएमा ।
- जल विन्दु भएमा ।
- पिसाब नलाग्ने समस्या भएमा ।
- दम भएमा ।
- पेट वा आन्द्रामा अल्सर रहेमा ।

नकारात्मक असरहरू :

वाकवाकी, बान्ता, मुख सुख्खा हुनु, निन्द्रा नलाग्नु, रिंगटा लाग्नु ।

यदि हात खुट्टा काम्ने, मुटुको धड्कन छिटो छिटो हुने, पिसाब गर्न गाह्रो हुन गएमा औषधिको सेवन बन्द गरि दिनुहोला ।

यो औषधि गर्भवती तथा स्तनपान गराउनेले सकेसम्म नखानुहोला । आवश्यक परे चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र खानुहोला ।

टस्सिभ-डी ५० मि.लि.को बोतलमा र टस्सिभ डी एक्स १०० मि.लि.को बोतलमा उपलब्ध छ ।

भण्डारण गर्ने तरिका :

सुख्खा ठाउँमा राख्नुहोस् ।

३० डि.से भन्दा कम तापक्रममा राख्नुहोस् ।

बच्चाहरूको पहुँचबाट टाढा राख्नुहोस् ।

This content was last revised on June 2026.

**National
Healthcare**